

# 数学新星问题征解

第二十三期 (2017.08)

主持: 牟晓生

**第一题.** 给定正整数  $n > 1$ . 考虑将  $n$  分拆为若干正整数  $b_1, b_2, \dots, b_t$  的和. 求所有分拆变化下

$$S = 2 \sum_{i=1}^t i b_i + \sum_{i=1}^t b_i^2$$

的最小可能值.

(复旦附中 肖恩利 供题)

**第二题.** 已知  $H$  为锐角三角形  $ABC$  的垂心.  $D, E$  分别是边  $AB, AC$  上的点, 满足  $AD = AE$  且  $D, H, E$  共线. 延长  $DE$  交  $\triangle ABC$  的外接圆  $\omega$  于  $K, L$  两点. 过  $D$  作  $AB$  的垂线, 过  $E$  作  $AC$  的垂线, 两条垂线交于  $N$ . 延长  $HN$  与圆  $\omega$  上的  $BC$  弧交于  $S$ , 而  $KS, LS$  分别与  $BC$  交于  $X, Y$ . 证明:  $\triangle SXY$  的外接圆经过  $\triangle ABC$  的外心.

(湖南雅礼中学学生 王子安 供题)

**第三题.** 设  $F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k$  是一个整系数的形式幂级数, 其中  $a_0 \neq 0$ . 而  $F'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k \cdot x^{k-1}$  是它的导函数. 已知  $\frac{F'(x)}{F(x)}$  也是整系数的形式幂级数, 证明  $a_0$  整除每个  $a_k$ .

(哈佛大学 牟晓生 供题)

**第四题.** 求最大的正常数  $C$ , 使得对每个凸多边形  $P$  及其任意顶点  $u$ , 都能找到  $P$  的另外两个顶点  $v, w$ , 满足

$$\text{area}(\triangle uvw) \geq C \cdot \text{area}(P).$$

(普林斯顿大学 张瑞祥 供题)